

VORBEREITUNG DES PATIENTEN AUF DEN FeNO-TEST



DIES IST EIN VORGESCHLAGENES PROTOKOLL, ANDERE PROTOKOLLE KÖNNEN VERFÜGBAR SEIN.

24 STUNDEN VOR DEM TEST:

Es wird empfohlen, 24 Stunden vor dem Test keinen Alkohol zu trinken ¹.

12 STUNDEN VOR DEM TEST:

Es wird empfohlen, 12 Stunden vor dem Test nicht mehr zu rauchen ¹.

Es wird empfohlen, auf den Verzehr von Lebensmitteln mit hohem Nitratgehalt zu verzichten, darunter u. a. ²:

Rucola	Rüben	Karotten
Spinat	Kohl	Kartoffeln
Salat	Grüne Bohnen	Knoblauch
Rettich	Lauch	Paprika
Rote Beete	Frühlingszwiebeln	Grüne Paprika
Chinakohl	Gurke	

TESTTAG:

Am Tag des Tests wird empfohlen, eine Stunde vor dem Test auf Folgendes zu verzichten ²:

Essen	Rauchen
Trinken	Sport

*Laut den ATS/ERS-Richtlinien, auf die unten verwiesen wird, können die genannten Aktivitäten die FeNO-Werte beeinflussen. MGC Diagnostics empfiehlt daher, diese Aktivitäten für einen begrenzten Zeitraum zu vermeiden.

REFERENZEN:

1. ATS/ERS Recommendations for Standardized Procedures for the online and offline measurement of exhaled lower respiratory nitric oxide and nasal nitric oxide, 2205. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2005; 171 8): 912-930.
2. Lidder S, Webb A. Vascular effects of dietary nitrate (as found in green leafy vegetables and beetroot) via the nitrate--nitrite-nitric oxide pathway. British Journal of Clinical Pharmacology. 2013; 75(3): 677-696.

MGC DIAGNOSTICS CORPORATION, through its subsidiary Medisoft S.A.
350 Oak Grove Parkway St. Paul, Minnesota USA 55127-8599



Medisoft S.A. P.A.E de Sorinnes, Rue du Clairon 5
5503 Sorinnes BELGIUM

© 2024 MGC Diagnostics Corporation or one of its affiliates. All rights reserved.

All specifications subject to change without notice. Products may vary from those illustrated.

MGC Diagnostics and its affiliates are equal opportunity/affirmative action employers committed to cultural diversity in the workforce.

Part# 060178-005 RevA

